


ЕСЛИ ВРАЧ ВАМ НАЗНАЧИЛ ПИКОСУЛЬФАТ НАТРИЯ + МАГНИЯ ОКСИД (ПИКОПРЕП) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИИ ИЛИ ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С 9 ЛЕТ



ПРОЦЕДУРА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ¹

ЭТАП 1

1 саше



150 мл
2-3 минуты



После обеда или ранним
вечером за день
до колоноскопии

16:00-18:00

ЭТАП 2

Пить после саше

Не менее 5x250 мл (5 стаканов)
воды или прозрачной жидкости
в течение нескольких часов

ЭТАП 3

1 саше



150 мл
2-3 минуты



Через 5-6 ч после 1 этапа

22:00-24:00

ЭТАП 4

Пить после саше


Не менее 3x250 мл (3 стакана)
воды или прозрачной жидкости
в течение нескольких часов



ПРОЦЕДУРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ¹

ЭТАП 1

1 саше



150 мл
2-3 минуты



Вечер перед колоноскопией

17:00-21:00

ЭТАП 2

Пить после саше

Не менее 5x250 мл (5 стаканов)
воды или прозрачной жидкости
в течение нескольких часов

ЭТАП 3

1 саше



150 мл
2-3 минуты



Утро в день колоноскопии
за 5 часов до колоноскопии

ЭТАП 4

Пить после саше

Не менее 3x250 мл (3 стакана)
воды или прозрачной жидкости
в течение нескольких часов

ОБЛАДАЕТ ПРИЯТНЫМ АПЕЛЬСИНОВЫМ ВКУСОМ



250 мл



200 мл



150 мл



- Для правильной подготовки к исследованию необходимо строго придерживаться инструкции к препарату, при передозировке препарата возможна профузная диарея

1. Инструкция к препарату Пикопреп

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ



Ф.И.О. _____

Дата _____

Время _____

ВРЕМЯ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА

После 1-го саше

Время	Объем



до 3-х литров

После 2-го саше

Время	Объем

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЕТЕ ПЕРЕД ПОДГОТОВКОЙ КИШЕЧНИКА К ОБСЛЕДОВАНИЮ

ЗА 2 ДНЯ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ!



Пища, богатая клетчаткой



Фрукты
и овощи

Зелень



Крупы



Злаки



Бобовые



Грибы
и ягоды



Хлеб



Легко расщепляемые продукты



Бульон

Отварное
мясо



Рыба



Сыр



Масло



Вареное яйцо
и омлет



Кисломолочная
продукция



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ