


# ПИКОПРЕП® СПОСОБСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ПОДГОТОВКЕ КИШЕЧНИКА В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ<sup>3</sup>



ДОКАЗАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Доля пациентов с хорошей и отличной оценкой подготовки кишечника (n=215)




Пикопреп – всего 300 миллилитров раствора препарата и 2 литра воды или прозрачного напитка для эффективной подготовки к колоноскопии

# ПИКОПРЕП® ПРЕВОСХОДИТ ПОЧТИ В 2 РАЗА КОМБИНАЦИЮ ПЭГ С БИСАКОДИЛОМ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ<sup>4</sup>



ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ

Доля пациентов с хорошей и отличной оценкой подготовки кишечника (n=83)



GASTRO/PICOPREP/003/2018

ПЭГ - полиэтиленгликоли

Материал предназначен для специалистов здравоохранения

## КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ

В ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКЕ КИШЕЧНИКА<sup>1</sup>




- **МОЩНЫЙ ПРОМЫВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ<sup>2</sup>**
- **ВСЕГО 300 МЛ РАСТВОРА ПРЕПАРАТА И 2 ЛИТРА ВОДЫ ИЛИ ПРОЗРАЧНОГО НАПИТКА**
- **УДОБНАЯ СХЕМА ПРИЕМА**



Материал предназначен для специалистов здравоохранения

# ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ<sup>2</sup>

комбинированный эффект:  
осмотический и стимулирующий



**УСИЛЕННАЯ ПЕРИСТАЛЬТИКА И НАКОПЛЕНИЕ ВОДЫ В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ СОЗДАЕТ МОЩНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОМЫВАНИЯ**



**ПИКОПРЕП<sup>®</sup>**  
пикосульфат натрия + цитрат магния

Материал предназначен для специалистов здравоохранения

## Краткая информация о препарате Пикопреп<sup>®</sup>

Регистрационный номер: ЛП-002537.

Торговое наименование препарата: Пикопреп<sup>®</sup>.

**Лекарственная форма:** порошок шипучий для приготовления раствора для приема внутрь. **Состав.** Один пакетик содержит: действующие вещества: лимонная кислота безводная 12,0 г, магния оксид 3,5 г, пикосульфат натрия моногидрат 10,0 мг; вспомогательные вещества: калия гидрокарбонат 0,5 г, натрия сахарината дигидрат 0,06 г, ароматизатор апельсиновый 0,06 г.

**Показания к применению:** очищение кишечника перед проведением рентгенологических или эндоскопических (колоноскопия) исследований и хирургических манипуляций у взрослых и детей с 1 года. Препарат не применяется как регулярное слабительное средство!

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, хроническая сердечная недостаточность, дегидратация, слабость моторики желудка, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, токсический колит, токсический мегаколон, кишечная непроходимость, тошнота и рвота, тяжелые нарушения функции почек, рабдомиолиз, гипермагниемия, острые хирургические абдоминальные состояния: острый аппендицит, диагностированная или подозреваемая обструкция или перфорация желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения, непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция, тяжелые нарушения (снижение) функции почек, детский возраст до 1 года. Полный перечень ограничений и информация по применению при беременности и в период грудного вскармливания содержится в инструкции по применению препарата.

**Способ применения и дозы:** для приема внутрь. Для взрослых и детей старше 9 лет: содержимое одного саше растворить в стакане воды (приблизительно 150 мл), размешивать 2-3 минуты до получения раствора со слабым апельсиновым ароматом, в случае нагревания охладить до приемлемой температуры и выпить. Если процедура назначена на первую половину дня: содержимое первого пакетика принимают после обеда или ранним вечером (16-18 ч), запивая не менее чем 5 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости (вода, негазированные безалкогольные напитки, чай, кофе, фруктовый сок без мякоти)

## Ссылки

1. Katz P.O., et al. Am J Gastroenterol. 2013;108(3):401-409. 2. Инструкция по применению препарата Пикопреп. 3. Safety, efficacy and tolerability of PICO-SALAX for colon cleansing prior to colonoscopy in an elderly population. Fowler S. et al. Can J Gastroenterol. 2009;23(A)99 (торговое наименование в других странах может отличаться от зарегистрированного в РФ). 4. Turner D. et al. PICO-SALAX versus PEG for bowel cleanup before colonoscopy in children: a randomized controlled trial. Endoscopy. 2009;41(12):1038-1045.

в течение нескольких часов. Содержимое второго пакетика принимают на ночь (22-24 ч), запивая не менее чем 3 стаканами по 250 мл воды в течение нескольких часов. Последний стакан можно выпить не позднее чем за 2 часа до процедуры. Если процедура назначена на вторую половину дня: содержимое первого пакетика принимают вечером (в 17-21 ч) в день, предшествующую процедуре, запивая не менее чем 5 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости в течение нескольких часов. Содержимое второго пакетика принимают утром (за 5-9 ч до процедуры), запивая не менее чем 3 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости в течение нескольких часов. Последний стакан можно выпить не позднее чем за 2 часа до процедуры. Дети от 1 года до 9 лет: подготовка и дозирование раствора препарата производится при помощи прилагаемой мерной ложки. Детальный режим приготовления и дозирования раствора в особых клинических случаях содержится в инструкции по применению препарата.

**Побочное действие.** Наиболее часто: тошнота, головная боль, рвота. Полный перечень побочных эффектов, взаимодействий с другими лекарственными средствами и особых указаний содержится в инструкции по применению препарата.

**Срок годности:** 3 года. Использовать сразу же после вскрытия пакетика. Вскрытый, но неиспользованный пакетик подлежит уничтожению.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения:** Ферринг

Арчаймittle ГмбХ, Киль, Германия. С претензиями обращаться по адресу: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 4. Тел: (495) 287-0343; факс: (495) 287-0342.

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Пикопреп<sup>®</sup>



**FERRING**  
PHARMACEUTICALS

ООО «ФЕРРИНГ ФАРМАСЕТИКАЛЗ»  
115054, Москва, Космодамианская наб.,  
д. 52, стр. 4, БЦ «Риверсайд Тауэрз»  
Тел.: (495) 287 0343, факс: (495) 287 0342  
E-mail: info@ferring.ru, www.ferring.ru


# ЕСЛИ ВРАЧ НАЗНАЧИЛ ПИКОСУЛЬФАТ НАТРИЯ + МАГНИЯ ОКСИД (ПИКОПРЕП) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИИ ИЛИ ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ



## ДОЗА 1 (10-18 ч до колоноскопии)


Дети  
**1-2 ГОДА**

1 ложка




Дети  
**4-9 ГОДА**

1 пакетик



Дети  
**2-4 ГОДА**


2 ложки



Дети  
**≥ 9 ГОДА**

Взрослая доза


1 пакетик



## ДОЗА 2 (4-6 ч до колоноскопии)


Дети  
**1-2 ГОДА**

1 ложка




Дети  
**4-9 ГОДА**

2 ложки



Дети  
**2-4 ГОДА**


2 ложки



Дети  
**≥ 9 ГОДА**

Взрослая доза

1 пакетик



ОБЛАДАЕТ ПРИЯТНЫМ АПЕЛЬСИНОВЫМ ВКУСОМ



250 мл



200 мл



150 мл

После приема каждой дозы рекомендуется дополнительно выпивать любую прозрачную жидкость (вода, холодный чай и т.п.) из расчета 40–50 мл на кг веса ребенка, в несколько приемов, дробно (максимум – 2 л).

1. Инструкция к препарату Пикопреп

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ



Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Время \_\_\_\_\_

## ВРЕМЯ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА

После 1-го саше

Время	Объем



до 3-х литров

После 2-го саше

Время	Объем

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЕТЕ ПЕРЕД ПОДГОТОВКОЙ КИШЕЧНИКА К ОБСЛЕДОВАНИЮ

ЗА 2 ДНЯ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ!



Пища, богатая клетчаткой



Фрукты и овощи

Зелень



Крупы

Злаки



Бобовые

Грибы и ягоды



Хлеб



Легко расщепляемые продукты



Бульон

Отварное мясо



Рыба

Сыр



Масло

Вареное яйцо и омлет



Кисломолочная продукция

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ