

КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ


В ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКЕ КИШЕЧНИКА¹



- **МОЩНЫЙ ПРОМЫВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**
- **ВСЕГО 300 МЛ РАСТВОРА ПРЕПАРАТА И 2 ЛИТРА ВОДЫ ИЛИ ПРОЗРАЧНОГО НАПИТКА**
- **УДОБНАЯ СХЕМА ПРИЕМА**

КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ

В ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКЕ КИШЕЧНИКА¹




- **МОЩНЫЙ ПРОМЫВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ²**
- **ВСЕГО 300 МЛ РАСТВОРА ПРЕПАРАТА И 2 ЛИТРА ВОДЫ ИЛИ ПРОЗРАЧНОГО НАПИТКА**
- **УДОБНАЯ СХЕМА ПРИЕМА**



Материал предназначен для специалистов здравоохранения.

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ²

комбинированный эффект: осмотический и стимулирующий



УСИЛЕННАЯ ПЕРИСТАЛЬТИКА И НАКОПЛЕНИЕ ВОДЫ В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ СОЗДАЕТ МОЩНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОМЫВАНИЯ



Материал предназначен для специалистов здравоохранения.

Краткая информация о препарате Пикопреп®

Регистрационный номер: ЛП-002537.

Торговое наименование препарата: Пикопреп®.

Лекарственная форма: порошок шипучий для приготовления раствора для приема внутрь. **Состав.** Один пакетик содержит: действующие вещества: лимонная кислота безводная 12,0 г, магния оксид 3,5 г, пикосульфат натрия моногидрат 10,0 мг; вспомогательные вещества: калия гидрокарбонат 0,5 г, натрия сахарината дигидрат 0,06 г, ароматизатор апельсиновый 0,06 г. **Показания к применению:** очищение кишечника перед проведением рентгенологических или эндоскопических (колоноскопия) исследований и хирургических манипуляций у взрослых и детей с 1 года. Препарат не применяется как регулярное слабительное средство!

Противопоказания: повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, хроническая сердечная недостаточность, дегидратация, слабость моторики желудка, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, токсический колит, токсический мегаколон, кишечная непроходимость, тошнота и рвота, тяжелые нарушения функции почек, рабдомиолиз, гипермагниемия, острые хирургические абдоминальные состояния: острый аппендицит, диагностированная или подозреваемая обструкция или перфорация желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения, непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозогалактозная мальабсорбция, тяжелые нарушения (снижение) функции почек, детский возраст до 1 года. *Полный перечень ограничений и информация по применению при беременности и в период грудного вскармливания содержится в инструкции по применению препарата.*

Способ применения и дозы: для приема внутрь. Для взрослых и детей старше 9 лет: содержимое одного саше растворить в стакане воды (приблизительно 150 мл), размешивать 2-3 минуты до получения раствора со слабым апельсиновым ароматом, в случае нагревания охладить до приемлемой температуры и выпить. Если процедура назначена на первую половину дня: содержимое первого пакетика принимают после обеда или ранним вечером (16–18 ч), запивая не менее чем 5 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости (вода, негазированные безалкогольные напитки, чай, кофе, фруктовый сок без мякоти) в течение нескольких часов. Содержимое второго пакетика принимают на ночь (22–24 ч), запивая не менее чем 3 стаканами по 250 мл воды в течение нескольких часов. Последний стакан можно выпить не позднее чем за 2 часа до процедуры. Если процедура назначена

на вторую половину дня: содержимое первого пакетика принимают вечером (в 17–21 ч) в день, предшествующий процедуре, запивая не менее чем 5 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости в течение нескольких часов. Содержимое второго пакетика принимают утром (за 5–9 ч до процедуры), запивая не менее чем 3 стаканами по 250 мл воды или прозрачной жидкости в течение нескольких часов. Последний стакан можно выпить не позднее чем за 2 часа до процедуры. Дети от 1 года до 9 лет: подготовка и дозирование раствора препарата производится при помощи прилагаемой мерной ложки. *Детальный режим приготовления и дозирования раствора у детей от 1 года до 9 лет, а также применения препарата в особых клинических случаях содержится в инструкции по применению препарата.*

Побочное действие. Наиболее часто: тошнота, головная боль, рвота. *Полный перечень побочных эффектов, взаимодействий с другими лекарственными средствами и особых указаний содержится в инструкции по применению препарата.*

Срок годности: 3 года. Использовать сразу же после вскрытия пакетика. Вскрытый, но неиспользованный пакетик подлежит уничтожению.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения: Ферринг

Арцнаймпель ГмбХ, Киль, Германия.

С претензиями обращаться по адресу: 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 4.

Тел.: +7 495 287-03-43, факс: +7 495 287-03-42

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Пикопреп®.



000 «Ферринг Фармасетикалз»
115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 4,
БЦ «Риверсайд Тауэрс»
Тел.: +7 495 287-03-43, факс: +7 495 287-03-42
E-mail: info@ferring.ru, www.ferring.ru

¹ Katz P. O. et al. Am J Gastroenterol. 2013;109(3):401-409.

² Инструкция по применению препарата Пикопреп®.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕСШЛАКОВОЙ ДИЕТЕ ПЕРЕД ПОДГОТОВКОЙ К КОЛОНОСКОПИИ, РЕКТОРОМАНОСКОПИИ И СИГМОСКОПИИ

за 3 дня до исследования

НЕЛЬЗЯ

Пища, богатая клетчаткой



Фрукты и овощи



Зелень



Крупы



Злаки



Бобовые



Грибы и ягоды



Хлеб



Орехи, сухофрукты

МОЖНО

Легкорасщепляемые продукты



Бульон

250–300 мл



Отварное мясо

350 г



Рыба

300 г



Сыр

150 г



Масло

80 г



Вареное яйцо и омлет



Кисло-молочная продукция без добавок

350 мл



Мёд

Если вы страдаете запорами, необходимо ежедневно принимать слабительные препараты (вплоть до дня подготовки), которыми вы обычно пользуетесь.

Для заметок _____

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ




СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПИКОПРЕП® ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ (КОЛОНОСКОПИЯ), РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ

- За 3 дня до исследования – бесшлаковая диета (см. рекомендации на обороте).
- За 1 день до исследования – начало приема препарата Пикопреп® по следующей схеме: содержимое одного пакетика препарата Пикопреп® растворить в 150 мл воды комнатной температуры, перемешивать в течение 2–3 минут.
- Выпить полученный раствор необходимо в следующей последовательности:

ЕСЛИ ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНА НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ



Выпить раствор
1-го пакетика
с 14:00 до 18:00




Начало приема:

в _____ : _____

После приема 1-го пакетика препарата **ВЫПЕЙТЕ** постепенно в течение 2 часов **НЕ МЕНЕЕ 5** стаканов по 250 мл любой прозрачной жидкости

Выпить раствор
2-го пакетика
с 22:00 до 24:00



Начало приема:


в _____ : _____

После приема 2-го пакетика препарата **ВЫПЕЙТЕ** постепенно в течение 1 часа **НЕ МЕНЕЕ 3** стаканов (по 250 мл) любой прозрачной жидкости. Последний стакан можно выпить не позднее чем за 1 час до процедуры

ЕСЛИ ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНА НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ



Выпить раствор
1-го пакетика
с 17:00 до 21:00




Начало приема:

в _____ : _____

ВЫПЕЙТЕ постепенно в течение 2 часов **не МЕНЕЕ 5** стаканов прозрачной жидкости объемом по 250 мл

Выпить раствор
2-го пакетика
за 5–9 часов
до процедуры



Начало приема:

в _____ : _____

ВЫПЕЙТЕ постепенно в течение 1 часа **НЕ МЕНЕЕ 3** стаканов прозрачной жидкости объемом по 250 мл. Последний стакан можно выпить не позднее чем за 1 час до процедуры

Не пейте непрозрачные жидкости, употребление которых может затруднить выполнение исследования: красные или пурпурные жидкости, молоко и молочные продукты, алкогольные напитки.